

SAVERIO ROCCHI & FABIO TERZANI

NOTA SU ALCUNI CRYPTOCEPHALINI E CASSIDINI DEI MONTI REATINI (LAZIO)
(Coleoptera, Chrysomelidae)

Riassunto. La nota riguarda alcune specie di Cryptocephalini e Cassidini raccolte sui Monti Reatini (Lazio). *Pachybrachis ruffoi ruffoi* Burlini, 1956 e *Cassida (Cassida) deflorata* Suffrian, 1844 risultano nuove per il Lazio. Sulla vegetazione lungo il fiume Peschiera sono state contemporaneamente raccolte dieci specie di Cryptocephalini.

Abstract. *Note on some Cryptocephalini and Cassidini of the Reatini Mountains (Latium).* Some species of Cryptocephalini and Cassidini collected in the Reatini Mountains (Latium). *Pachybrachis ruffoi ruffoi* Burlini, 1956 and *Cassida (Cassida) deflorata* Suffrian, 1844 are new for Latium. Ten species of Cryptocephalini were collected together on the vegetation along the Peschiera River.

Key words. Coleoptera, Chrysomelidae, records, Latium.

Introduzione

Durante una breve campagna di ricerche svolte sui Monti Reatini in provincia di Rieti sono state reperite alcune specie di Cryptocephalini e di Cassidini, fra le quali due non ancora segnalate per il Lazio. Inoltre, sulla vegetazione lungo le rive delle sorgenti del fiume Peschiera, sono state contemporaneamente raccolte dieci specie di Cryptocephalini. Qui di seguito vengono forniti i relativi dati faunistici.

Pachybrachis ruffoi ruffoi Burlini, 1956

Lazio: Lodonero (RI), fiume Velino, m 600, 30.VI.2005, su *Salix* sp., 4 es., S. Rocchi!; Sigillo (RI), fiume Velino, m 625, 1.VII.2005, su *Salix* sp., 23 es., S. Rocchi e F. Terzani!
Nota: endemita italiano (corotipo appenninico sensu VIGNA TAGLIANTI et al., 1999). Sui Monti Sibillini vive anche la sottospecie *sibillinus* descritta da BURLINI (1959) su un solo esemplare maschio. La sottospecie nominale (BURLINI, 1956) è stata descritta su tre esemplari provenienti dal Massiccio del Pollino; per i caratteri esterni è pressoché impossibile distinguerla da *P. hippophaes* Suffrian, 1848 e soltanto la conformazione edeagica ne consente il sicuro riconoscimento; BURLINI (1968) la indica di alcune località dell'Emilia, dell'Abruzzo, del Molise, della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Sicilia, specificando che risulta diffusissima nell'Italia meridionale; successivamente è stata segnalata anche per le Marche (SASSI, 2005). A nostra conoscenza si tratta pertanto della prima segnalazione per il Lazio.

Cassida (Cassida) deflorata Suffrian, 1844

Lazio: Monte Terminillo (RI), Pian de' Valli, m 1.600, 1.VII.2005, 1 es., F. Terzani!; Vasche (RI), sorgenti del fiume Peschiera, m 410, 2.VII.2005, 1 es., S. Rocchi!; in entrambi i casi la raccolta è avvenuta falciando la vegetazione.
Nota: specie del Mediterraneo occidentale; vive sulle piante di carciofo ma anche sui cardi selvatici dei generi *Cirsium* e *Silybum*. SASSI (1994) ne riassume la distribuzione in Italia indicando le seguenti regioni: Liguria, Toscana, Campania, Sicilia e Sardegna; aggiunge inoltre alcune località riguardanti anche l'Emilia, la Puglia, la Basilicata e la Calabria. A nostra conoscenza si tratta pertanto della prima segnalazione per il Lazio.

Le raccolte lungo le rive delle sorgenti del fiume Peschiera sono state effettuate il 2.VII.2005 nei pressi della località Vasche in provincia di Rieti, ad una quota di m 410. Questo corso d'acqua è un piccolo affluente di sinistra del fiume Velino e nasce dalle pendici calcaree del Monte Nuria; lungo le sue rive è presente una rigogliosissima vegetazione costituita da una numerose specie erbacee, arbustive e arboree. Falciando la suddetta vegetazione, nell'arco di una mattinata, sono state raccolte dieci specie di *Cryptocephalini*, numero abbastanza considerevole e probabilmente dovuto alla presenza di così tante essenze vegetali, fra le quali anche moltissimi salici che, come noto, sono piante sulle quali vivono gli adulti di diverse specie appartenenti a questa tribù. Qui di seguito forniamo l'elenco delle specie reperite, seguito dal numero di esemplari e dal relativo indice di frequenza (rapporto fra il numero di esemplari di ciascuna specie ed il numero degli esemplari raccolti in totale):

Specie	Es.	%
<i>Cryptocephalus (Burlinius) ocellatus ocellatus</i> Drapiez, 1819	10	20
<i>Cryptocephalus (Burlinius) scapularis</i> Suffrian, 1848	2	4
<i>Cryptocephalus (Burlinius) strigosus</i> Germar, 1824	10	20
<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) biguttatus</i> (Scopoli, 1763)	1	2
<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) flavipes</i> Fabricius, 1781	2	4
<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) moraei</i> (Linnaeus, 1758)	1	2
<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) samniticus</i> Leonardi & Sassi, 2001	8	16
<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) sericeus zambanellus</i> Marseul, 1875	8	16
<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) signatifrons</i> Suffrian, 1847	1	2
<i>Pachybrachis hieroglyphicus</i> (Laicharting, 1781)	7	14
Totali	50	100

Ringraziamenti

Si ringrazia il Dr. Davide Sassi di Castelmarte (CO) per la collaborazione prestata nella determinazione del materiale oggetto della presente nota.

Bibliografia

- BURLINI M., 1956. Due nuovi *Pachybrachis* italiani. *Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia dell'Università*, Napoli, 8 (3): 1-7.
- BURLINI M., 1959. Nota sui *Pachybrachis* appenninici e descrizione di una nuova razza. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale*, Verona, 7: 199-201.
- BURLINI M., 1968. Revisione delle specie italiane e della maggior parte delle specie europee del genere *Pachybrachis* Chev. (Coleoptera Chrysomelidae). *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, 47: 11-116.
- SASSI D., 1994. Le Cassidine appenniniche del Museo di Storia Naturale di Verona (Coleoptera Chrysomelidae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale*, Verona, 18 (1991): 53-90.
- SASSI D., 2005. Insecta Coleoptera Chrysomelidae Cryptocephalinae. In: Ruffo S. & Stoch F. (eds.), Checklist e distribuzione della fauna italiana. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale*, Verona, 2. serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 223-225, con dati su CD-ROM.
- VIGNA TAGLIANTI A., AUDISIO P.A., BIONDI M., BOLOGNA M.A., CARPANETO G.M., DE BIASE A., FATTORINI S., PIATTELLA E., SINDACO R., VENCHI A. & ZAPPAROLI M., 1999. A proposal for chorotype classification of the Near East fauna, in the framework of the Western Palearctic region. *Biogeographia, Lavori della Società italiana di biogeografia*, (n. s.), 20: 31-59.

Indirizzo degli Autori: Saverio Rocchi & Fabio Terzani, collaboratori esterni del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, Sezione di Zoologia "La Specola", Via Romana 17, 50125 Firenze (Italy), roccisaverio@yahoo.it, tterza@tin.it